



भा. कृ. अनु. प.- केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर

ICAR-Central Institute for Cotton Research, Nagpur

An ISO 9001:2015 Certified Organisation



పత్తి సాగు- పదుకొండవ వారపు సలహా, 20 ఆగస్ట్ 2024 నుండి 26 ఆగస్ట్ 2024వరకు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్		గత వారంలో అసలైన వర్షపాతం (mm)					వచ్చే వారంలో వర్షపాతం అంచనా (mm)				
		ఆగస్ట్					ఆగస్ట్				
		16	17	18	19	20	22	23	24	25	26
	గుంటూరు	0	0	0	8	0	8	9	10	6	6
	ప్రకాశం	0	0	0	0	0	11	13	18	4	4
వర్షపాతం మొత్తం మరియు రంగు		0.1 to 2.4 mm		2.5 to 15.5 mm		15.6 to 64.4 mm		64.5 to 115.5 mm		115.6 to 204.4	
వర్షపాత వర్ణం		చాలా తక్కువ వర్షపాతం		తేలికపాటి వర్షపాతం		మోస్తరు వర్షపాతం		భారీ వర్షపాతం		అతి భారీ వర్షపాతం	

పంట పరిస్థితి:

గుంటూరు ప్లాంట్ లో పంట 28 రోజులు శాఖీయ దశలో ఉంది. ఇంకా ప్రత్తి విత్తం జరుగుతుంది. కొద్ది ప్లాంట్లలో రసం పీల్చే పురుగుల ఉద్యమి ఆర్థిక సహన స్థాయిలకన్నా తక్కువగా ఉంది.

నంద్యాల ప్లాంట్ లో పంట 53 నుండి 87 రోజులలో ఉంది, పంట గోడ, పూత మరియు కాయ దశలో ఉంది. గత వారంలో ఎక్కువ ఎండ మరియు అననుకూల పరిస్థితులు గమనించడం జరిగింది. గడ్డి మరియు వెడల్పాటి జాతి కలుపు మొక్కలు పొలం లో గమనించడం జరిగింది. కలుపు తీయుట, పైపాటుగా ఎరువులు వేయుట మరియు పురుగు మందుల పిచికారీ చేయడం జరిగింది. తామర పురుగులు మరియు పచ్చ దోమ ఉద్యమి ఆర్థిక సహన స్థాయిలకన్నా ఎక్కువగా ఉంది.

సలహా:

గుంటూరులో, ఇంకా పంట విత్తన రైతులు వేసుకునే ముందు విత్తన శుద్ధి చేయాలని సూచించారు. ఇమిడాక్లోపిరిడ్ 600 FS @ 9ml/kg విత్తనానికి మరియు సూడోమోనాస్ ఫ్లోరిసెన్స్ @ 10g/kg లేక టీరీకోడెర్మా విరిడే @ 8g/kg లేక కార్బోక్విన్ 37.5%+ తేరం 37.5% DS @ 3.5g ప్రతి కిలో విత్తనానికి విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి (వేరు కుళ్ళు మరియు బాక్టీరియా రోగాలకు) లేక ఫ్లూక్సాఫేరాక్సాడ్ (333 g/L FS) @1.5 ml కిలో విత్తనానికి లేక టెట్రాకోనాజోల్ 11.6% W/W (12.5% w/v) SL @1.5 ml కిలో విత్తనానికి విత్తన శుద్ధికి చేసుకుంటే నెల ద్వారా మరియు విత్తనాల ద్వారా సంక్రమించే తెగుళ్ళను నివారించవచ్చు. పెండిమిథాలిన్ 30% EC కులుపు మందును ఎకరా 1.0 లీటర్ విత్తన 48 గంటలలో పిచికారీ చేసుకోవాలి. ఎకరాకు భాస్పారమ్ 60 kg , 50 kg నత్రజని మరియు 20 kg పోటాష్ ఎరువులు విత్తన 30 రోజులలోపు వేసుకోవాలి.

నంద్యాల ప్లాంట్ రైతులు లీటర్ నీటికి 20g యూరియా లేదా 5g 19 -19 -19 కలిపి పిచికారీ చేడడం వల్లనా బెట్టుకు తట్టుకుంటుంది. క్విజాలోఫోప్ ఈడ్రెల్ @ 400ml గడ్డి జాతి కలుపుకు పిచికారీ చేయాలి, పీరిథిరోబాక్ సోడియం @ 250ml ఒక ఎకరాకు 200 లీటర్ నీటిలో కలిపి వెడల్పాటి జాతి కలుపుకు పిచికారీ చేయాలి. పంట పొలాల్లో ఒక ఎకరాకు 8 పసుపు మరియు బులుగు జిగురు అట్టలు రసం పీల్చే పురుగుల నివారణకు అమర్చుకోవాలి. ఎకరాకు 2 లింగాకర్షక బుట్టలను గులాబీ రంగు పురుగు ఉద్యమిని గమనించాడని అమర్చుకోవాలి మరియు సమయానికి మార్చుకోవాలి. ముందు జాగ్రత్తగా ఆకు మచ్చ తెగులు నివారణకు ప్రిఫెనికోనజోల్ @ 1ml/lit నీటికి లేక కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ 3g/lit నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి. రసం పీల్చే పురుగుల ముక్కంగా పెను బంక, తామర పురుగుల నివారణకు ముందు జాగ్రత్తగా 5% వేప గింజల కషాయం లేక వేప నూనె లేక వేప ఆధారిత మందులు లీటర్ నీటికి 5 ml/l (300 లేక 1500 ppm)+ 1.0g సోప్ డిటర్జెంట్ తో పాటు పిచికారీ చేసుకోవాలి. రసం పీల్చే పురుగుల ఉద్యమి ఎక్కువగా ఉన్న ప్లాంట్లలో ఒక ఎకరాకు ఫ్లోనికేమిడ్ 50WG 80g లేక బుప్రోఫెజిన్ 25SC 400ml లేక డైఫెంతియూరోన్ 50WP 240g, 200 లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి. గులాబీ రంగు పురుగు నివారణకు ఎకరాకు ప్రిఫెనికోనజోల్ @ 400 ml లేదా క్లోరోపిరిఫాస్ @ 500 ml పిచికారీ చేసుకోవాలి.