


**ଭା.କ.ଅ.ଦୁ.ପ.- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କପା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନାଗପୁର
କପା ଚାଷ ପାଇଁ XXVII(ସତେଇଶତମ) ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ**

ODISHA		ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଷା (ମିମି)					ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆନୁମାନିକ ବର୍ଷା (ମିମି)				
		ନଭେମ୍ବର/ ଡିସେମ୍ବର					ଡିସେମ୍ବର				
		06	07	08	09	10	12	13	14	15	16
	କୋରାପୁଟ	0	0	0	0	0	0.2	0.1	0.1	0.1	0
	କଳାହାଣ୍ଡି	0	0	0	4	0	0	0	0	2	2
	ବଲାଙ୍ଗିର	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ବର୍ଷ ପରିମାଣ ଓ ରଙ୍ଗ ସଂକେତ		୦.୧ ରୁ ୨.୪ ମି ମି		୨.୫ ରୁ ୧୫.୫ ମିମି		୧୫.୬ ରୁ ୨୪.୪ ମିମି		୨୪.୫ ରୁ ୧୧୫.୫ ମିମି		୧୧୫.୬ ରୁ ୨୦୪.୪ ମିମି	
ବର୍ଷା ପ୍ରକାର		ଅତି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା		ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା		ସାଧାରଣ ବର୍ଷା		ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା		ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା	

କପା ଫସଲ ଅବସ୍ଥା:

ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ କପା ଫସଲ 152-162 ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ତୃତୀୟ ଥରକପା ଡୋଲିବା କମ ଚାଲିଛି । ପ୍ରାୟ ସବୁ କପା ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୁନିଆ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକ ଓ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଡି ପୋକ, ଲେଡା ପୋକ ଲାଗିଥିବାର ଖବର ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ଆର୍ଥିକ ତାହେଲି ସୀମା ତଳେ ଅଛି । ଅଣବିଚି କପରେ ଅମେରିକୀୟ ବକରା ବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗି ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଧୂସର ପତ୍ର ଦାଗ ଓ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ର ପୋଡା ରୋଗ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ।

ପରାମର୍ଶ:

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିଥିବା କପା ତୋଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସିମେଣ୍ଟ୍ ଚଟାଣ କିମ୍ବା ତାରପଲିନ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଏହାର ଆର୍ଦ୍ରତା 8-10 % ରାହାଏ । ପ୍ରଥମ ଥର ତୋଳା ଯାଇଥିବା କପାକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ । ପୋକ ଓ ରୋଗର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ପାଟଳ ବକରା ବିନ୍ଧା ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ତାହେଲି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 250 ମିଲି ସାଇପାରମେଥରିନ 10%EC, କିମ୍ବା 100 ମିଲି ସାଇପାରମେଥରିନ25%EC କିମ୍ବା 200 ମିଲି ଲମ୍ବଡା ସାଇହଲୋଟ୍ରିନ 5% ଇସି କିମ୍ବା 200 ମିଲି ଡେଲ୍ଟା ମେଥୁନ 2.8 EC କିମ୍ବା 350 ମିଲି ଫେନପ୍ରୋପଥରିନ 10 %ଇସି କିମ୍ବା 200 ମିଲି ଫେନଭାଲେରେଟ 20%EC କିମ୍ବା 120 ମିଲି ଆଲଫା ସାଇପାରମେଥରିନ10%EC ଅଭକ୍ଷକକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପାଟଳ ବକରା ବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଫଳ ଶତା ଓ ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲିଟର ପିଛା 3.0 ଗ୍ରାମ କରବେନ୍ଦାଜିମ 12%+ ମାଲ୍‌କୋଜେବ 63% WP କିମ୍ବା 1 ମିଲି/ଲିଟର ଅଡୋକ୍ସିସ୍ତ୍ରୋବିନ 18.2%w/w + ଡିଫେନୋକୋନାଜୋଲ 11.4 % w/w କିମ୍ବା 1 ମିଲି/ଲିଟର କ୍ରେସୋକ୍ସିମ ମିଥାଇଲ 44.3 5 ଏସସି କିମ୍ବା 1 ମିଲି/ଲିଟର ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ 25 EC କିମ୍ବା 0.4 ଗ୍ରାମ /ଲିଟର କରବେନ୍ଦାଜିମ 50WP ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଧୂସର ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ମିଲି ଲିଟର କ୍ରେସୋକ୍ସିମ ମିଥାଇଲ 44.3% SC କିମ୍ବା 1 ମିଲି ଲିଟର ଆୟୋକ୍ସିସ୍ତ୍ରୋବିନ 18.2 % ଓ ଡାଇଫେନୋକୋନାଜୋଲ 11.4% ର ମିଶ୍ରଣ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଉନ୍ନତ କପା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥା ମୂଲିକା ଓ ବିହନ ଚୟନ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ , ବୁଣିବା ପଦ୍ଧତି, ଜଳସେଚନ ଓ ଘାସ ପରିଚାଳନା, ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟୋଏଡ ଆଧାରିତ (ସିଆଇସିଆର କଟନ ଆପ)CICR Cotton App ଯାହାକି ଆଇସିଏଆରସିଆଇସିଆର-, ନାଗପୁର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ରୁ ମିଳି ପାରିବ । ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରୁ ଏହି ଆପ କୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ କରା ଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ଛଡା ଫସଲର ଅବସ୍ଥା ଓ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡିକ ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର ୱେବ ସାଇଟ ରେ ଅପଲୋଡ କରା ଯାଇଛି, ଯାହାସବୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳି ପାରିବ ।