

இ.வே.ஆரா.கு - மத்திய பருத்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

பதினோறாவது வாரம் - வாராந்திர ஆலோசனைகள்- பருத்தி பயிர் சாகுபடி (1-7 ஆகஸ்ட் 2019)

(32^{வது} நிலையான வாரம்)

“இங்குதரப்பட்டுள்ள அறிவுரைகள் - அந்தந்த மாநில அரசு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை”

வானிலை ஆலோசனை

இ.வா.ஆ.து	பெய்த மழையளவு - ஜூலை/ ஆகஸ்ட் (மி.மீ)					கணிக்கப்பட்டுள்ள மழையளவு -ஆகஸ்ட் (மி.மீ)						ஆலோசனை
	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	
மாவட்டம்	மாநிலம்					தமிழ் நாடு						
பெரம்பலூர்	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	இவ்வாரத்தில் கோயம்புத்தூர் மற்றும் அருகில் உள்ள பகுதிகளில், பருத்தி பயிரிடுதல் நடைபெறுகிறது. மேலும், பயிரிடப்பட்ட பருத்தியானது 8 முதல் 14 நாள் முளைப்பு பருவத்தில் உள்ளது. இடைவெளி நிரப்புதலுக்கான காலம் முடிவடைந்து விட்டது. வயல்களில் பருப்பு கீரை மற்றும் சாரணைகளைகளானது சில பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. அடிதண்டு வேர் அழுகல் நோய் காணப்படுகிறது.
சேலம்	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் மற்றும் அருகில் உள்ள பகுதிகளில் பருவ மழையை தொடர்ந்து பருத்தி பயிர் நடவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆலோசனைகள் கோயம்புத்தூர் பருத்தி பயிரிடும் விவசாயிகள் 15 நாட்களுக்குள் இடைவெளி நிரப்பவும். ஒரு ஹெக்டேரில் களைகளை கட்டுப்படுத்த நடவுக்கு பிறகு 24-48

திருச்சி	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	<p>மணிக்குள் பெண்டிமேத்தலின் 30 இ. சி. @ 2.5 லி தெளிக்கவும். நல்ல வடிகால் வசதி செய்து தேங்கிய நீரை வெளியேற்றவும். அடிதண்டு வேர் அழுகல் நோயை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும். இந்நோய் காணப்பட்டால் கார்பன்டசும் 50 டபிள்யு பி @ 1.2 கி/ லி என கலந்து அறிகுறிகள் காணப்படுகிற மற்றும் சுற்றியுள்ள செடிகளின் வேர்ப்பகுதிகளில் ஊற்றவும்.</p> <p>ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் மற்றும் அருகில் உள்ள பகுதிகளில், வேர் அழுகல் மற்றும் பாக்கிரியா நோய்களை கட்டுப்படுத்த, விதைக்கும் முன்பாக விதை நேர்த்தி செய்யவும். கீழ் உள்ள மூன்று முறைகளில் ஏதாவது ஒன்றை பயன்படுத்தவும். கார்பாக்ஸின் 37.5 % மற்றும் திரம் 37.5% டிஎஸ் @ 3.5கி/கி கி. (அல்லது) ப்ளுபைறோசாட் (333 கி/லி எஃப் யெஸ் @ 1.5 மி லி/ கி கி (அல்லது) டெட்ராகோனோஜோல் 11.6 % டபிள்யு/ டபிள்யு (12.5% டபிள்யு/வியெஸ் எல் @ 1.5 மி.லி/கி கி.</p>
விருதுநகர்	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	<p>ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் மற்றும் அருகில் உள்ள பகுதிகளில், வேர் அழுகல் மற்றும் பாக்கிரியா நோய்களை கட்டுப்படுத்த, விதைக்கும் முன்பாக விதை நேர்த்தி செய்யவும். கீழ் உள்ள மூன்று முறைகளில் ஏதாவது ஒன்றை பயன்படுத்தவும். கார்பாக்ஸின் 37.5 % மற்றும் திரம் 37.5% டிஎஸ் @ 3.5கி/கி கி. (அல்லது) ப்ளுபைறோசாட் (333 கி/லி எஃப் யெஸ் @ 1.5 மி லி/ கி கி (அல்லது) டெட்ராகோனோஜோல் 11.6 % டபிள்யு/ டபிள்யு (12.5% டபிள்யு/வியெஸ் எல் @ 1.5 மி.லி/கி கி.</p>

புனைவுகள்				
மழையளவு (மி.மீ)	< 5	5-20	20-50	> 80

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு: முனைவர். அ. மணிகண்டன், முனைவர். ம. சரவணன்