


ଭା.କ.ଅ.ସୁ.ପ.- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କପା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନାଗପୁର
କପା ଚାଷ ପାଇଁ XXII (ବାଇଶ ଡମ) ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ (17 ରୁ 23 ଅକ୍ଟୋବର, 2023)

ODISHA		ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଷା (ମିମି)					ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆନୁମାନିକ ବର୍ଷା (ମିମି)				
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର					ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ଅକ୍ଟୋବର				
		13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
	କୋରାପୁଟ	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
	କଳାହାଣ୍ଡି	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ବଲାଙ୍ଗିର	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ବର୍ଷ ପରିମାଣ ଓ ରଙ୍ଗ ସଂକେତ		୦.୧ ରୁ ୨.୪ ମି ମି		୨.୫ ରୁ ୧୫.୫ ମିମି		୧୫.୬ ରୁ ୨୪.୪ ମିମି		୨୪.୫ ରୁ ୧୧୫.୫ ମିମି		୧୧୫.୬ ରୁ ୨୦୪.୪ ମିମି	
ବର୍ଷା ପ୍ରକାର		ଅତି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା		ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା		ସାଧାରଣ ବର୍ଷା		ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା		ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା	

କପା ଫସଲ ଅବସ୍ଥା:

ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଫସଲ ବକରା ବଢ଼ିବା ଓ ଫୁଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । କପା ଫସଲ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ବର୍ଷା ହୋଇ ନଥିବାରୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ଆଦ୍ର ଅଛି । ଜମିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଘାସ ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଘାସ ବଛା, କୋଡାଖୋସା, ଘାସପରା ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ କର ଯାଇଛି । କପାରେ ପତ୍ରଡ଼ିଆଁ ପୋକ ଅର୍ଥକ ଡାହେଲି ସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ , କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ, ଲେଡ଼ା ପୋକ ଓ ଅଣବିଟି କପା ଫସଲରେ ଆମେରିକୀୟ ବକରାବିନ୍ଧା ପୋକ ଅର୍ଥକ ଡାହେଲି ସୀମା ତଳେ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ସ୍ଥାନରୁ ପାଉଁସିଆ ପତ୍ର ଦାଗ, ଝଞ୍ଜାଳା, ମୂଳ ଶଙ୍ଖା ଓ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗର ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ପରାମର୍ଶ:

କପା ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିଥିବା ବକରାରୁ କପା ତୋଳନ୍ତୁ । କପା ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗୋ ଓ ପୋକର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରଡ଼ିଆ ଓ ଜଉ ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦାହେଲି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ ୫୦ WG କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ ଡାଇନେଟୋଫୁରଣ 20 SG କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ ଆଇୟମେଥୋକ୍ସାମ 25 WG ଅଭକ୍ଷକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରଡ଼ିଆ ପୋକ ଓ ଧଳାମାଛି ପୋକର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮ ଟି ସମ୍ପା ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ । ପଟଳ ବକରା ବିନ୍ଧା ପୋକ ଓ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୫ ମିଲି କ୍ଲୋରୋପାଇରୋଫୋସ 20 EC କିମ୍ବା ୨୦ ମିଲି କ୍ଲୁନାଲଫୋସ 20 AF କିମ୍ବା ୩୦ ମିଲି ପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ 50 EC ଓଭକ୍ଷକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଅଣ ବିଟି କପା ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକୀୟ ବକରା ବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ଗ୍ରାମ ଏମାମେକଟାମିନ ବେଞ୍ଜିଓୟଟ କିମ୍ବା 20 ମିଲି ପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ କୀଟନାଶକ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ମୂଳ ଶଙ୍ଖା ଓ ଝଞ୍ଜାଳା ରୋଗ ଲାଗିଲେ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 12 ଗ୍ରାମ କର୍ବେନ୍‌ଡାଜିମ 50 WP କିମ୍ବା 50 ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଦେ କିମ୍ବା 50 ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ହେର୍ଜିଅନୁମ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 25-30 ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସି କ୍ଲୋରାଇଡ 50 WP ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଫିଫି ଜନିତ ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 30 ଗ୍ରାମ କରବେନଡାଜିମ 12%+ ମାଲ୍‌କୋଜେବ 63% WP କିମ୍ବା 10 ମିଲି କ୍ରେସୋକ୍ସିମ-ମିଥଲଲ 44.3%SC କିମ୍ବା 10 ମିଲି ଅୟୋକ୍ସିକ୍ସୋବିନ 18.2% w/w + ଡିଫେନୋକନାଡୋଲ 11.4% w/w SC ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉନ୍ନତ କପା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥା ମୃତ୍ତିକା ଓ ବିହନ ଚୟନ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ , ବୁଣିବା ପଦ୍ଧତି, ଜଳସେଚନ ଓ ଘାସ ପରିଚାଳନା, ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟୋଏଡ ଆଧାରିତ ସିଆଇସିଆର କଟନ ଆପ (CICR Cotton App) ଯାହାକି ଆଇସିଏଆରସିଆଇସିଆର-, ନାଗପୁର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ରୁ ମିଳି ପାରିବ । ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରୁ ଏହି ଆପ କୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ କରା ଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ଛଡା ଫସଲର ଅବସ୍ଥା ଓ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର ୱେବ ସାଇଟ ରେ ଅପଲୋଡ କରା ଯାଉଛି, ଯାହାସବୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳି ପାରିବ ।