


ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ. - ਕੇਂਦਰੀ ਕਪਾਹ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ, ਨਾਗਪੁਰ
ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 23ਵੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹ (24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ)

ਪੰਜਾਬ	ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮੀਂਹ (ਮਿਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ-ਆਈ. ਐੱਮ. ਡੀ.)	ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (ਮਿਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ-ਆਈ. ਐੱਮ. ਡੀ.)									
		ਅਕਤੂਬਰ					ਅਕਤੂਬਰ				
		20	21	22	23	24	26	27	28	29	30
	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ						0	0	2	0	0
	ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	ਮੁਕਤਸਰ	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
	ਬਠਿੰਡਾ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	ਸੰਗਰੂਰ	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
	ਲੁਧਿਆਣਾ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਕੋਡ	0.1 to 2.4 ਮਿ. ਮੀ.	2.5 to 15.5 ਮਿ. ਮੀ.		15.6 to 64.4 ਮਿ. ਮੀ.		64.5 to 115.5 ਮਿ. ਮੀ.		115.6 to 204.4 ਮਿ. ਮੀ.			
ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ	ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ		ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੀਂਹ		ਭਾਰਾ ਮੀਂਹ		ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਮੀਂਹ			

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਹਾਲਤ :

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਟੀਂਡੇ ਖਿੜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹਰੇ ਟੀਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 % ਤੱਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਟੀਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ 20 % ਸੀ। ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਂਡੇ ਗਲਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਟੀਂਡੇ ਖਿੜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਲਾਹ :-

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ (ਸ਼ਰੈਂਡਿੰਗ) ਕਰ ਦਿਓ। ਟੀਂਡੇ ਗਲਣ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਉੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਧੱਬਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਬੋਡਾਜ਼ਿਮ 50 ਡਬਲਯੂ ਪੀ @ 0.04 % ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਡਾਜ਼ਿਮ 12 % + ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ 63 % ਡਬਲਯੂ ਪੀ @ 0.3 % ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਕਸਿਮ ਮਿਥਾਈਲ 44.3 ਐਸਸੀ @ 0.1 % ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੀਨੇਬ 70 ਡਬਲਯੂ ਪੀ @ 0.25 % ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ 25 ਈ ਸੀ @ 0.01 % ਜਾਂ ਮੇਟੀਰਾਮ 55 % + ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 5 % ਡਬਲਯੂ ਜੀ @ 0.2 % ਜਾਂ ਅਜੋਕਸੀਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 18.2 % ਡਬਲਯੂ / ਡਬਲਯੂ + ਡਿਫੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ 11.4 % ਡਬਲਯੂ / ਡਬਲਯੂ ਐਸਸੀ @ 0.1 % ਜਾਂ ਫਲੈਕਸਪਾਈਰੋਕਸੋਲ 167 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ + ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 333 (ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ) ਐਸ ਸੀ @ 0.6 % ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਜੜ੍ਹ ਗਲਣ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਡਾਜ਼ਿਮ 50 ਡਬਲਯੂ ਪੀ @ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਹਾਰਜੀਆਨਮ ਜਾਂ ਟੀ. ਵਿਰਾਈਡ ਡਬਲਯੂ ਪੀ @ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਗੜ੍ਹ ਕਰੋ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਚੁਗਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਰਮਾ ਖਿੜਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਥਰੇਲ 39 % (ਈਥੇਫੇਨ 39 %) @ 5.0 ਮਿਲੀਲੀਟਰ / ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਲੈਣ। ਇਸ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 85-90 % ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਰਾਲ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਸਾਫ਼, ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਲ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੋ। ਕਪਾਹ ਝੜਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁਗਾਈ ਕਰੋ। ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲੇ ਖਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਅੱਡੇ-ਅੱਡ ਰੱਖੋ। ਆਖਰੀ ਚੁਗਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ

ਮਿੱਟੀ ਪਲਟਾਉ ਪਲਾਓ ਹਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ ।