


ଭା.କୃ.ଅ.ସୁ.ପ.- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କପା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନାଗପୁର

କପା ଚାଷ ପାଇଁ XXVI (ଛବିଶ ତମ) ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ (14th to 20th Nov, 2023)

| ODISHA | | ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଷା (ମିମି) | | | | | ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆନୁମାନିକ ବର୍ଷା (ମିମି) | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|----|------------------|----|-------------------|--------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----|
| | | ନଭେମ୍ବର | | | | | ନଭେମ୍ବର | | | | |
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | କୋରାପୁଟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 3 |
| | କଳାହାଣ୍ଡି | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| | ବଲାଙ୍ଗିର | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ବର୍ଷ ପରିମାଣ ଓ ରଙ୍ଗ ସଂକେତ | | ୦.୧ ରୁ ୨.୪ ମି ମି | | ୨.୫ ରୁ ୧୫.୫ ମିମି | | ୧୫.୬ ରୁ ୨୪.୪ ମିମି | | ୨୪.୫ ରୁ ୧୧୫.୫ ମିମି | | ୧୧୫.୬ ରୁ ୨୦୪.୪ ମିମି | |
| ବର୍ଷା ପ୍ରକାର | | ଅତି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା | | ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା | | ସାଧାରଣ ବର୍ଷା | | ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା | | ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା | |

କପା ଫସଲ ଅବସ୍ଥା:

ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଫସଲ 136 ରୁ 146 ଦିନ ବେଳରେ ବକରା ବଢ଼ିବା ଓ ଫୁଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । କପା ଫସଲ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର କପା ଡୋଳିକା କମ ଚାଲିଛି । ଫସଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟସାର ଓ ରୋଗୋ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ଓ ଫିଫିନାଶକ ଔଷଧ ସିଂଚନ କମ ଚାଲିଛି । କପାରେ ପତ୍ରତଥା ପୋକ ଅର୍ଥକ ଡାହେଲି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ , କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ, ଲେଡ଼ା ପୋକ ଓ ଅଣବିଟି କପା ଫସଲରେ ଆମେରିକୀୟ ବକରାବିନ୍ଧା ପୋକ ଅର୍ଥକ ଡାହେଲି ସୀମା ତଳେ ରହିଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣିଥରେ ପତ୍ରଖୁଆ ଲେଡ଼ା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ହେୟାବା ସହିତ ନାଲି ଡଗର ପୋକର ସନରମାନ ବଢ଼ିଛି । ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ସ୍ଥାନରୁ ପାଉଁସିଆ ପତ୍ର ଦାଗ, ଝଉଂଳା, ମୂଳ ଶଇଫା ଓ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗର ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ପରାମର୍ଶ:

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିଥିବା ବକରାରୁ କପା ଡୋଳନ୍ତୁ । ଡୋଳିଥିବା କପାକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ କିମ୍ବା ତାରପଲିନ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଏହାର ଆଦ୍ରତା 8-10% ଭିତରେ ରହିବ । ପ୍ରଥମରେ ଡୋଳା ହୋଇଥିବା କପାକୁ ଅଲଗା କରି ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ଯାହାକି ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ପ୍ରଥମ ଥର କପା ଡୋଳିବା ପରେ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 100 ଗ୍ରାମ NPK 19:19:19: ସାରକୁ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ଵାରା ବଳକା ବକରା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ି ପାରିବ । କପା ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗୋ ଓ ପୋକର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ପତ୍ରତଥା ଓ ଜଉ ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦାହେଲି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ ୫୦ WG କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ ଡାଇନେଟୋପୁରଣ 20 SG କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ ଆଇୟମେଥୋକ୍ସାମ 25 WG ଅଭିଷେଧକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପାଟଳ ବକରା ବିନ୍ଧା ପୋକ ଆର୍ଥିକ ଦାହେଲି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏକର ପ୍ରତି 300 ମି ଲି ସଇପାରମେଥରିନ 10% EC କିମ୍ବା 200 ମି ଲି ସଇପାରମେଥରିନ 25% EC କିମ୍ବା 200 ମି ଲି ଲମ୍ବଡ଼ା ସାଇହଲୋଥ୍ରୁ 5% EC କିମ୍ବା 200 ମି ଲି ଦେଲ୍ମେଥେନ 2.8 EC କିମ୍ବା 300-400 ମି ଲି ଫେନପ୍ରୋପଥରିନ 10% EC କିମ୍ବା 200 ମି ଲି ଫେଲ୍ମେରେଟ 20% EC କିମ୍ବା 120 ମି ଲି ଆଲଫା ସାଇପାରମେଥରିନ 10 EC ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଅଣ ବିଟି କପା କିମ୍ବା ଦେଶୀ (ଅର୍ବୋରୀଅମ) ଚାଷ ହେଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକୀୟ ବକରା ବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ମି ଲି ଫ୍ଲୁବେଣ୍ଡିଆମଇଡ 39.35 SC କିମ୍ବା 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ଗ୍ରାମ ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ 14.5 SC କିମ୍ବା 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 4 ମି ଲି ସ୍ପିନୋସାଇ 45 SC ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମୂଳ ଶଇଫା ଓ ଝଉଂଳା ରୋଗ ଲାଗିଲେ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 12 ଗ୍ରାମ କର୍ବେନ୍‌ଡାଇମ 50 WP କିମ୍ବା 50 ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଦେ କିମ୍ବା 50 ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ହେର୍ଜିଅନୁମ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପାଉଁସିଆ ପତ୍ର ଦାଗ (ଗ୍ରେ ମିଲ୍‌ବ୍ୟୁ) ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 30 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେନ୍‌ଡାଇମ 12% + ମଲ୍‌କୋଡେବ 63% WP କିମ୍ବା 10 ମିଲି ଆୟୋକ୍ସିକ୍ସୋବିନ 18.2% + ଡିଫେନୋକୋନାଜୋଲ 11.4%SC କିମ୍ବା 10 ମିଲି କ୍ରେସୋକ୍ସିମ-ମିଥାଇଲ 44.3 %SC ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 25-30 ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସି କ୍ଲୋରଇଡ 50 WP ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଗଛ ପ୍ରତି 7-8 ଟି ଫଳ ଥିଲେ ଔଷଧ ସିଂଚନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ । ଫସଲକୁ ଅନୁମୋଦିତ ଅବଧି ଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅମଳ ସମାପ୍ତ ହେବ ପରେ ପୋକ ଏବଂ ରୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଫଳ ଓ ଗଛକୁ ଜମିରୁ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଉତ୍କଳ କପା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥା ମୃତ୍ତିକା ଓ ବିହନ ଚୟନ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ , ବୁଣିବା ପଦ୍ଧତି, ଜଳସେଚନ ଓ ଘାସ ପରିଚାଳନା, ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟୋଏଡ ଆଧାରିତ ସିଆଇସିଆର କଟନ ଆପ)CICR Cotton App) ଯାହାକି ଆଇସିଏଆରସିଆଇସିଆର-, ନାଗପୁର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ରୁ ମିଳି ପାରିବ । ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରୁ ଏହି ଆପ କୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ କରା ଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ଛଡ଼ା ଫସଲର ଅବସ୍ଥା ଓ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର ୱେବ ସାଇଟ ରେ ଅପଲୋଡ କରା ଯାଉଛି, ଯାହାସବୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳି ପାରିବ ।